

PROSPECT · PUREGLYCEMIC BIOCORE®

Glicemie și metabolism · Berberină HCl ≥98% berberină 150mg + Extract Lagerstroemia speciosa — Banaba 1% acid corosolic 150mg + Extract Momordica charantia — Castravete Amar acțiune insulinoimitică 150mg + Extract Cinnamomum verum — Scorțișoară Ceylon curbe post-prandiale, colesterol LDL 150mg + Fosfolipide BioCORE® — Lecitină floarea soarelui 50mg
per porție (2 capsule) — 60 capsule vegetale — 30 zile

1. COMPOZIȚIE

Ingrediente active per porție (2 capsule): Berberină HCl ≥98% berberină **150mg**, Extract Lagerstroemia speciosa — Banaba 1% acid corosolic **150mg**, Extract Momordica charantia — Castravete Amar acțiune insulinoimitică **150mg**, Extract Cinnamomum verum — Scorțișoară Ceylon curbe post-prandiale, colesterol LDL **150mg**, Fosfolipide BioCORE® — lecitină floarea soarelui **50mg**.

Capsulă: pullulan — polizaharid natural obținut prin fermentarea amidonului. Barieră superioară la oxigen față de capsulele HPMC, fără plastifianți sintetici.

Aditivi: Formula NU conține maltodextrină, stearat de magneziu, dioxid de siliciu, dioxid de titan, coloranți sintetici, conservanți, gluten sau lactoză.

2. PREZENTARE ȘI AMBALAJ

Capsulă tare vegetală (pullulan). Flacon din sticlă farmaceutică ambră (tip III), capac filetat cu folie de etanșare, desicant inclus. **60 capsule per flacon** — 30 zile la doza zilnică recomandată.

3. INDICAȚII

PureGlycemic combină patru ingrediente care acoperă complet dezechilibrul glicemic — de la glicemia crescută dimineața pe nemâncate și valorile ridicate la analize, la poftă incontrollabilă, energie instabilă și rezistență la insulină. Efectele se construiesc progresiv în 3 etape confirmate de studii

- Reducere semnificativă a glicemiei la jeun — primele semne după 4–6 săptămâni de administrare
- Vărfuri post-prandiale atenuate — scorțișoară și castravete amar stabilizează curba glicemică după masă
- Reducere glicemie la jeun și HbA1c — confirmat în meta-analiză pe 27 studii clinice (Guo et al., 2021)
- Banaba (acid corosolic): îmbunătățire sensibilitate la insulină la persoane cu prediabet — confirmat clinic (Derosa et al., 2025)
- Senzație de foame controlabilă după 2–3 săptămâni — nu mai ai poftele alea bruște de dulce
- Energie constantă pe parcursul zilei — fără prăbușiri după-amiaza sau oboseală post-masă

Suplimentele alimentare nu sunt medicamente. Nu diagnostichează, nu tratează, nu vindecă afecțiuni. Consultați medicul în prezența unor afecțiuni diagnosticate.

4. MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Doza zilnică recomandată: 2 capsule pe zi (Berberină HCl ≥98% berberină 150mg + Extract Lagerstroemia speciosa — Banaba 1% acid corosolic 150mg + Extract Momordica charantia — Castravete Amar acțiune insulinoimitică 150mg + Extract Cinnamomum verum — Scorțișoară Ceylon curbe post-prandiale, colesterol LDL 150mg + Fosfolipide BioCORE® — lecitină floarea soarelui 50mg), distribuite pe parcursul zilei, la mesele principale. Se înghit întregi cu apă. Nu se mestecă.

Notă biodisponibilitate: BioCORE® asigură absorbția optimă prin fosfolipidele din formulă.

Durata curei: 84 zile.

Nu se depășește doza zilnică recomandată.

5. CONTRAINDICAȚII

- Sarcină — date clinice insuficiente
- Alăptare — date clinice insuficiente
- Copii și adolescenți sub 14 ani

6. ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII

- Consultați medicul dacă urmați tratament cronic înainte de inițiere
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor

7. INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE

Dacă urmați tratamente antidiabetice orale sau insulinoterapie, consultați medicul înainte de a lua PureGlycemic. Ingredientele active (în special berberina) au efecte hipoglicemice proprii, care se pot cumula cu medicația prescrisă. Nu înlocuiți tratamentul prescris fără avizul medicului.

- antidiabetice

8. SARCINĂ ȘI ALĂPTARE

Utilizarea în sarcină și alăptare nu este recomandată din cauza datelor clinice insuficiente privind siguranța. Consultați medicul.

9. REACȚII ADVERSE

Rare (<1/100): ușoare reacții digestive tranzitorii la inițierea curei.

Foarte rare (<1/1.000): reacții alergice la componentele formulei. Întrerupeți și consultați medicul.

10. SUPRADOZAJ

Toxicitate acută nedocumentată la dozele uzuale. A nu se depăși doza zilnică recomandată. La apariția simptomelor neobișnuite, întrerupeți și consultați medicul.

11. CONDIȚII DE PĂSTRARE

Sub 25°C, ferit de umiditate și lumină directă. Ambalaj original (sticlă ambră). A nu se utiliza după data de expirare.

REFERINȚE CLINICE (SELECȚIE)

- Guo et al., 2021:** Reducere semnificativă a glicemiei la jeun și a HbA1c confirmată în meta-analiză
PMID: 2074610
- Mes et al., 2025:** de suplimentare cu Castravete Amar îmbunătățesc biomarkeri glicemici
Mes et al., 2025
- Derosa et al., 2025:** Acidul corosolic din Banaba (1%) activează transportorii GLUT4 — proteinele care mută glucoza din sânge în interiorul celulelor. Rezultat: glucoza circulantă scade mai rapid după masă. Confirmat în st
Derosa et al., 2025
- Derosa et al., 2025:** Derosa et al., 2025
Derosa et al., 2025

FORMULA SINERGICĂ **BioCORE® Multi-ingredient**

Formula conține 4 ingrediente active cu acțiune complementară, selectate și dozate pentru efect sinergic maxim. Fiecare ingredient este standardizat și testat analitic per lot.

4

ingrediente active

4×

absorbție față de formula
standard

650mg

per porție (activ + purtător)